



Lovačko Udruženje „Bošnjace“

lovacbosnjace@gmail.com

Ive Lole Ribara bb, 16232 Bošnjace 016/856-505
pib:102944563 mbr:17503138 žr: 205-61317-49
Predsednik 060/0-855-480 Sekretar 065/855-855-2
www.lovac.bosnjace.com

FENOLOŠKI KALENDAR PRIRODE

Poznavanje biologije divljači je neophodno za usklađivanje radova u lovištu sa godišnjim životnim ciklusima lovnih vrsta. Ovi podaci su veoma važni za preduzimanje odgovarajućih mera očuvanja vrsta u najosetljivijem periodu godine - periodu razmnožavanja.

Pregled osnovnih podataka o gnežđenju najzastupljenijih lovnih vrsta ptica :

Vrsta	Biomasa (kg)	Gde pravi gnezdo	Kada pravi gnezdo	Broj jaja	Dužina leženja (dana)	Br. legla godišnje	s/m	Status
Divlja guska	3,0-5,0	na zemlji	III-IV	5 – 8	28-29	1	m	TZ
Divlja patka-gluvara	1,0-1,4	na zemlji u šašu, razna mesta	IV	7-14	22-28	1	s/m	L
Divlja patka-krdža	0,6–0,8	mo vara, rit	IV	9-12	26	1	m	L
Liska crna	0,4-0,5	mo vara, bara, rit	V	7–12	21	1	s	L
Fazan	1,2-1,6	na zemlji u šumi i polju	IV-V	10-12	24-28	1	s	L
Jarebica kamenjarka	0,5-0,7	kamenjar, grmlje	V-VI	10-15	21-24	1	s	TZ
Poljska jarebica	0,3–0,4	na zemlji u polju	V	10-22	23-24	1	s	Lcg
Prepelica	0,1	na zemlji u polju	IV-V	8-16	19-20	1	s/m	L
Šumska šljuka	0,2-0,5	na zemlji	IV-VIII	4	20-24	2	m	L
Golub grivnjaš	0,4-0,6	na drve u	IV-VII	2	15-18	2	s/m	L
Grlica	0,2–0,3	na drve u	IV-VII	2	14-17	2	m	L
Gugutka	0,25	na drve u i zgradama	III-IX	2	14-17	3 - 4	s	L
Jastreb kokošar	1,4–1,8	na starim stablima	IV	2-4	35-38	1	s	L
Siva vrana	1,2–1,4	na visokim stablima, u šumi	IV	4-6	20	1	s	L
Svraka	0,5-0,6	na drve u	III-IV	4-8	18	1	s	L

Većina vrsta ptica ima i odgaja samo jedno leglo godišnje, ali ima i vrsta koje to redovno čine dva ili čak više puta godišnje. One vrste ptica koje normalno imaju samo jedno leglo ukoliko im ono iz bilo kog razloga propadne, snesu i izvedu novo. Međutim, ta zakasnela legla uvek imaju manji broj jaja i manje šanse za preživljavanje mladunaca.