



Lova ko Udruženje „Bošnjace“
www.lovac.bosnjace.com

lovacbosnjace@gmail.com
Ive Lole Ribara bb, 16232 Bošnjace 016/856-505
zak.zastupnik 069/2-855-240 sekretar 065/855-855-2



Vakcinacija pasa je jedan od najvažnijih koraka za odgoj zdravih pasa, zato je veoma važno da se poštuje redosled i pravilan način vakcinacije pasa.

Mnogi lovci se protive vakcinaciji pasa, dok su drugi izričiti u tome da je to neophodno. S druge strane veterinari su saglasni - **vakcinacija psa** štiti zdravlje psa, ali štiti i naše zdravlje.

Mnoge bolesti, koje su posledica zanemarivanja vakcinacije, mogu se preneti na ljude. Ovo je razlog više zbog kog treba konsultovati veterinara i utvrditi plan vakcinacije za vašeg ljubimca.

Osnove vakcinacije za pse

Pre nego što uđemo u detalje, trebalo bi objasniti razliku između obaveznih i opcionih vakcina. Prve su, kako ime kaže, obavezne za sve pse i obavezujuće zakonom i striktnim rasporedom.

S druge strane, **neobavezne vakcine su opcione, ali to ne znači da ih ne treba primati**. Određene vakcine su potrebni psima u određenim okruženjima, zbog čega ne mogu biti obavezne svima. Veterinar će vam pomoći u određivanju opcionih vakcina koje bi vaš pas trebalo da primi.

Zašto treba vakcinisati psa?

Vakcinacija protiv zaraznih bolesti čuva i vaše i zdravlje vašeg psa. Većina bolesti je smrtonosna i postoji samo jedan način sprečavanja – vakcinacija.

6-8 nedelja

Obavezne vakcine: Štenećak, parainfluenca
Opciona vakcina: Bordetella bronchiseptica (pseći kašalj)

Između 6. i 8. nedelje vreme je za prvu vakcincu, protiv štenećaka i parainfluence. Štenećak je fatalna infekcija, koju štene može da dobije u kontaktu sa zaraženim psom ili u zaraženoj spoljašnjoj sredini. Najčešći simptomi su povraćanje, dijareja, kašalj i, u nekim slučajevima, grčevi.

Parainfluenca je zarazna i širi se putem vazduha. Reč je o respiratornoj infekciji, a simptomi su kijanje i kašalj. Što se tiče opcione vakcine protiv bakterije Bordetella bronchiseptica koja prouzrokuje pseći kašalj, ona je preporučljiva ako imate više pasa kod kuće ili ako vaš pas provodi puno vremena sa drugim psima u parkovima ili na drugim javnim mestima.

10-12 nedelja

Obavezne vakcine: DHPP
Opciona vakcine: Koronavirus, Leptospiroza, Bordetella, Lajmska bolest

Između 10. i 12. nedelje vreme je za DHPP vakcincu koja štiti od štenećaka, hepatitisa, parvovirusa i parainfluence.

Parvo je opasan virus koji može biti fatalan i najčešći simptom koji na njega ukazuje je krvava dijareja. Hepatitis je infekcija koja napada jetru i bubrege, a simptomi su slab apetit, kašalj i depresija. **Ovo je jedna od najbitnijih vakcina, budući da obuhvata sve ove bolesti i stoga je nezaobilazna.**

12-24 nedelja

Obavezna vakcina: Besnilo

Besnilo vodi do smrti, a može zahvatiti i ljude i životinje. Psi se mogu zaraziti ako ih već zaraženi pas ujede, ili ako zaražena pljuvačka dodje u dodir sa ranom. **Najvidljiviji simptom je agresija**, koja uglavnom dovodi do napadanja drugih životinja i pasa. Nakon napada, pas se oseća dezorientisano i kreće da se krije. Ostali simptomi su smanjen apetit, slabost i grčevi.

Lek protiv besnila ne postoji. Iako simptomi postaju vidljivi kada se pas zarazi, besnilo se može utvrditi tek nakon smrti. Stoga su zaraženi psi uspavani.

Najbolja prevencija protiv besnila je vakcinacija, koja je čak propisana zakonom i prima se jednom godišnje nakon prve vakcine. Budite odgovorni prema svom psu, sebi i drugima oko sebe i držite se predodređenog vremena vakcinacije.

12-16 meseci

Obavezne vakcine: Besnilo, DHPP
Opcione vakcine: Koronavirus, Leptospiroza, Bordetella, Lajmska bolest



- Određene vakcine se moraju primati redovno, kako bi imale efekta. Najbitnije su vakcine protiv besnila i DHPP vakcina. **DHPP vakcini treba primati jednom godišnje ili jednom u dve godine**, dok je **vakcina protiv besnila obavezna jednom u godinu dana**.

PLAN I RASPORED VAKCINACIJE PASA

Starost psa	Preporučene vakcine	Dodatne - opcione vakcine
6 do 8 nedelja	Štenećak, parainfluenca	Bordetella bronchiseptica
10 do 12 nedelja	DHPP vakcina (štenećak, hepatitis, parvovirus,parainfluenca)	Koronavirusna infekcija, Leptospiroza, Bordetella, Lajmska bolest
12 to 24 nedelja	Besnilo	/
14 do 16 nedelja	DHPP	Koronavirusna infekcija, Lajmska bolest, Leptospiroza
12 do 16 months	Besnilo, DHPP	Koronavirusna infekcija, Leptospiroza, Bordetella, Lajmska bolest
Svake godine	Besnilo (propisano zakonom)	/